



您在性 病和再生
殖系统方面疾病
的治疗指导。

LOVE BUGS™



MARIE STOPES
INTERNATIONAL

	细菌性阴道病	龟头炎	衣原体	膀胱炎	生殖器疣	淋病	甲肝	乙肝	丙肝	疱疹	HIV	非特异性尿道炎 男性疾病	盆腔炎 (PID)	阴虱	疥螨病	梅毒	鹅口疮/念珠球菌*	毛滴虫病
性途径感染/ 生殖系统感染	妇女病。有时候简称为BV或者加德诺菌属	男性疾病。阴茎头发炎，阴茎包皮中存在的生物大量繁殖所致。	一种细菌引起，可影响阴茎，宫颈，尿道，输卵管，肛门，直肠，也有时候影响咽喉和眼睛。	细菌引起之炎症，造成膀胱壁发炎，可延及肾脏，破坏肾功能。女性更为常见。	由人类乳头状瘤病毒引起(HPV)。	生殖器，喉咙或肛门部位细菌感染。	一种影响肝脏的病毒。	一种影响肝脏的病毒。	一种影响肝脏的病毒。	由单纯性疱疹病毒引起(HSV)。单纯性疱疹病毒有两种，一型病毒在嘴唇周围，俗称为唇疱疹，二型病毒在生殖器或肛门周围。	HIV (人类免疫缺陷病毒) 是一种破坏免疫功能的病毒，造成严重感染和癌症。艾滋病（获得性免疫缺陷综合征）是HIV的晚期感染的表现形式。	一种由细菌或病毒引起的男性尿道炎炎症。	妇女病。妇女生殖系统上部（宫颈，子宫和输卵管）发炎。	生长在生殖器及其他部位的微小寄生虫，生存在耻骨和体毛中。	隐藏在皮肤中的螨虫。	细菌感染，若不及时治疗可引发严重问题，包括损害心脏，大脑和脊髓。	生殖器或喉咙粘膜肿痛，因大量念珠球菌酵母菌繁殖所致	原虫引起的感染，通常称为“滴虫”。
怎样传播？	非性病传染，阴道中各类细菌失衡所致，如有了新的性伴侣或性活动增加。但有些性行为非活跃的妇女也有这样的问题。	并非总是性传播。一般发生在包皮未做切割的男子身上。包皮内温暖潮湿，适合生物生长，数日未清洗更易发生。	性行为传播或通过手指接触性器官后抹眼睛传播。接触后2-3周症状出现，但有时数年后无症状。	非性病，但性交后可能发生，由肛门之细菌进入尿道和膀胱或者膀胱排尿未尽引起。	皮肤接触引起，通常为无保护下性交所致，有时病毒传播源未确定。	性病，不做治疗会引起妇女盆腔炎(PID)，甚至男女不育症。与病源接触后3-5天出现症状。	可以通过性交传染，但主要通过食物和水污染，便后或拿食物时未洗手等方式传播。	可以通过性交传染，4-6周症状出现，非洲，亚洲南美洲常见。	血液传染（共用一个注射针头，针管等），很少通过性交传染。	通过皮肤紧密接触感染，包括无保护性交。有时感染后无病毒症状，口交时可从口传到生殖器。接触后3-10天症状出现。	性交传染，也可通过血液传染，如输血和针头。	一般来说通过性交传播，接触后2周左右症状出现。	可能是从前有性病（衣原体或淋病），但不是每个有过这样病的人都有盆腔炎。有时停止妊娠或其他外科处置也是原因。	性交时候身体紧密接触造成。同睡一床和穿有阴虱人衣服也可获得。几周后出现症状。	并非总是性交传染，皮肤接触，同睡一床和穿有螨虫人衣服也可获得，4周左右出现症状。	性传播	非性传播，细菌的大量繁殖可能是抗生素使用后，或患糖尿病，妊娠期，性交后及/或天气/饮食变化后，免疫力低下的结果。	性传播，接触后1-4周症状出现。
症状 (症状因人而异)	气味重(性交后或月经后加重)以及/或者带有淡灰/黄/绿色分泌物；有时候无症状。	点，红疹，痒，分泌物，性交时痛，排尿困难，肿，包皮发炎。	多数情况下无症状 女性:阴道分泌物异常增多，性交和小便有痛感，性交出血，腹部疼痛 男性:阴茎头分泌物，小便有痛感，若未及时治疗睾丸肿痛。	排尿时灼痛，尿频，尿血，腰痛，腹痛，发烧	生殖器（阴道/阴茎）和/或肛门周边肉眼可见疣/菜花瓣群（单个或组群）；有时痒。	女性:黄绿色阴道分泌物，性交痛，腹痛，小便灼痛，一半人无症状。 男性:阴茎黄色分泌物，肛门不适/分泌物，睾丸痛或小便痛，多数人有症状。	小便色重，轻微感冒状，呕吐，腹痛，皮黄，眼白黄，一般无症状。	小便色重，轻微感冒状，大便灰白，无食欲，盗汗，眼白与皮肤可能因黄疸而发黄。也可能无症状。	轻微感冒状，疲倦，呕吐腹痛，小便色重，皮黄，眼白黄，一般无症状。	生殖器上出现小泡群，破裂后留下溃疡疮，小便痛，腺肿大，痛楚。首次发病尤甚，复发时症状减轻，持续时间缩短。	染病后1-6周，许多人有病状腺热(发烧，出汗，腹泻 皮疹,口腔溃疡)，病情持续数日至数周，许多人数年无症状。	乳色脓状阴茎分泌物，小便灼痛，射精痛，痒，阴茎内刺痛感，骨盆痛及/或睾丸痛。有些人无症状。	症状不总是明显，轻微腹痛，性交痛，阴道分泌物味道强烈，月经不调和/或高烧。	发炎，刺激和/或耻骨周围奇痒。	痒，尤其是晚上身体某一特定部位，头部和背中央除外，皮疹。	一般在生殖器出现单一无痛透明溃疡面，腹股沟腺肿大，红疹，感冒状，脱发。有时无症状。	妇女:阴唇阴道瘙痒，红肿，疼痛，刺痛，小便痛，白带重，有时黄色，性交痛 男性:(少见)腺肿痛，阴茎有分泌物	妇女:阴唇阴道瘙痒，疼痛，白带气味重，有黄色泡沫，小便和性交痛 男性:一般无症状 - 偶尔小便痛，阴茎有分泌物。
治疗	抗生素片剂或阴道膏	抗真菌药膏；盐水澡，温水香皂清洗，注意护肤。	抗生素。女性若不治疗，可能会引起盆腔炎，易引起慢性疼痛，增加宫外孕甚至不育的危险。	多喝水，膀胱炎粉Ural®，抗生素	小疣 可由氦气除掉：冷冻，热疗 或化学涂料。一般要进行数次，因为疣有再生的危险。	抗生素	无治愈方法，需长期医疗观察，卧床，多喝水，禁酒和某些药物，可注射预防。	药物治疗可能对一些带菌者有效，慢性乙肝患者需长期医疗监督，禁酒和某些药物可注射预防。	无治愈方法，需长期医疗观察，休息，锻炼饮食科学，禁酒和某些药物，无注射预防。目前有一些抗病毒疗法	病情轻微（如唇疱疹）药膏即可；抗病毒药片剂，盐水解痛；不可治愈所以反复出现首次出现感染迹象后至皮肤恢复正常前应避免性接触。	无法治愈。最有效的疗法是一种抗病毒的综合疗法，直接攻击 HIV。	抗生素	抗生素	特殊洗身液/香波清洗患处。换床单和衣服	特殊洗身液清洗全身，药膏去痒，洗床单和衣服。	抗生素注射	抗真菌药膏，栓剂(放置阴道内)或盐水澡。严重时可用口服抗真菌药，如 Diflucan®。	抗生素

请记住：如果您发现性病，您所有现在和过去的性伴侣均须检查治疗。

性病最常见的传播就是通过无避孕套的阴道，肛门和口腔性交引起。如果您的性交没有保护，做一个简单的测验，确保您没问题。

有些性病不一定有症状（比如衣原体），有些可以数年潜伏，长期没有发现可能会导致盆腔炎，影响生育。所以尽管您没有症状，千万不可以掉以轻心。另一方面，尽管您有时痒，并不表明您有性病。

为了使您完全放心，您最好在马里斯托普国际诊所或者当地家计会或您自己的医生那里检查一下，因为症状因人而异。

请记住：

- 您和您的/所有的性伴侣需要同时治疗；不然的话没有接受治疗的一方会继续把病源传染给治愈的一方。您所有从前的性伴侣您认为有危险的话也应该接受检查和治疗。
- 只有男性避孕套既能避孕，也能防性病。
- 妇女：别忘了定期检查乳房，每两年做一次宫颈涂片检查。
- 男性：别忘了定期检查睾丸。

马里斯托普国际诊所在首都特区，昆士兰，新南威尔士州，维多利亚和西澳均设有中心，提供一系列的性健康和生殖健康专家服务，包括：

- 流产和后续服务
- 男性结扎术及之前的咨询辅导，处置过程10至15分钟，不用开刀，技术手段，精液测验，后续服务
- 避孕咨询，子宫环植入，植入避孕Implanon®，阴道环NuvaRing® 和注射避孕Depo Provera®
- 性病检查
- 咨询辅导
- 阴道镜检查（特定一些诊所）

马里斯托普确保每一个客户得到及时的帮助和支持，公平待人，坚持人性化和保密原则。没有排队等待名单，咨询时间灵活，可以享受国民保健卡折扣，我们的诊所环境舒适，没有医院的感觉，医疗服务水平一流。

如果想知道您附近诊所的服务详情或者预定就诊时间，请致电我们的全国服务中心，免费电话：

1800 003 707 (24小时)
或者游览我们的网址：

www.mariestopes.com.au

如果需要语言帮助请联系电话翻译部**131 450**



**MARIE STOPES
INTERNATIONAL**

马里斯托普國際診所力求為病人提供最佳服務，您的反饋對我們非常重要。如果您對改善我們信息服務或其他方面的服務有何建議，請填寫中心提供的“病人反饋意見表”或者找马里斯托普國際中心的團隊成員。如果您對马里斯托普國際中心所提供服務的任何方面感到不滿意，並且希望提出正式投訴，診所經理將立刻考慮您的投訴，開展調查並向您作出回覆。如果您對投訴的處理感到不滿，您的投訴將會轉到澳洲管理层那里。

© 2008 马里斯托普版权所有，未经许可不准翻印。

09/08/MI0263CH